

525

Tamaño: Medio.

Forma: Alargada, apuntada y con un labio más desarrollado.

Zona pistilar: Desplazada hacia uno de sus laterales. Ápice de forma variable. A veces es acuminado, con mucrón de tamaño diverso y base ancha, la cual está situada por debajo del plano tangente al vértice del fruto en sus laterales y por debajo en las dos caras, con cubeta muy pronunciada en el lado de la sutura. Algunos frutos presentan sólo esbozo de mamelón.

Sutura: Bien marcada con surco ancho de poca profundidad, hendido en la cavidad del pedúnculo y cerca del punto pistilar. Los dos lados de la sutura son rebajados. En alguna ocasión, en la cara dorsal, presentan como otra sutura ancha y rebajada.

Cavidad peduncular: Estrecha y profunda.

Piel: Velloso, de pubescencia abundante, corta y anteada. **Color:** Domina el amarillo anaranjado del fondo. Chapa rojo grana con punteado de aspecto marmóreo, dejando ver el fondo ampliamente y cubriendo hasta la mitad de la superficie.

Carne: Dura, amarilla, teñida de rojo junto al hueso. Muy jugosa, suave, granulosa, algo crujiente, agri dulce y poco aromática. **Sabor:** Bueno.

Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y grande, forma alargada con mucrón afilado. Levemente aplastado en sus lados laterales junto al polo peduncular. Cresta ventral muy poco saliente. Surco dorsal poco profundo, ancho en su mitad inferior, quedando completamente cerrado o desapareciendo en el resto. Superficie áspera, muy esculpida con surcos anchos, largos y profundos, junto a cresta ventral y en su tercio superior. El resto con surcos más cortos que se intercalan con algún orificio. Polo peduncular abierto.

Maduración: Segunda decena de agosto en Balaguer (Lérida).

